



¹ Problemas de riesgo vital:

Vía aérea: edema, ronquera, estridor

Respiración: taquipnea, sibilancias, fatiga, cianosis, Sp_O₂ < 92 %, confusión

Circulación: palidez, frialdad, tensión arterial baja, mareo, somnolencia/coma

² Adrenalina (administre IM salvo que tenga experiencia con adrenalina IV)

Dosis IM de adrenalina 1:1000 (repita tras 5 min si no mejora)

- Adulto 500 µg IM (0,5 mL)
- Niño de más de 12 años 500 µg IM (0,5 mL)
- Niño de 6-12 años 300 µg IM (0,3 mL)
- Niño de menos de 6 años 150 µg IM (0,15 mL)

Adrenalina IV para administración solo por especialistas con experiencia

Dosis: Adultos 50 µg; Niños 1 µg Kg⁻¹

³ Carga de líquidos IV (cristaloides):

Adulto 500 - 1000 mL
Niño 20 mL kg⁻¹

Detenga coloides IV si éstos pudieran ser la causa de anafilaxia

Adulto o niños de más de 12 años
Niños de 6 a 12 años
Niños de 6 meses a 6 años
Niños de menos de 6 meses

⁴ Clorfenamina
(IM o IV lento)

10 mg
5 mg
2,5 mg
250 µg kg⁻¹

⁵ Hidrocortisona
(IM o IV lento)

200 mg
100 mg
50 mg
25 mg